

SERRAVES

Cephalotaxus harringtonia (Forbes) Koch

12 Exemplares no Parque



Família

Cephalotaxaceae

Nome Comum

teixo-de-hokkaido

Origem

Ásia (China e Japão).

Tipo de Origem

[alóctone](#)

Autor

(Forbes) Koch

Descrição

[Arbusto](#) ou [árvore](#) de pequeno [porte](#) que pode alcançar 10 m de altura, no entanto, frequentemente não ultrapassa a forma arbustiva. [Espécie](#) dioica, [sempre-verde](#), resinosa. O [ritidoma](#) é [escamoso](#) de cor cinzento-avermelhada. Gemas inverniais ovóides, com 2 a 5 mm. As folhas são aciculares, verdes escuras, de textura lisa, dispostas em duas filas quase perfeitas (subdísticas), com a [nervura](#) central saliente e duas bandas estomáticas na [página](#) inferior; medem 2,5 a 6 cm de comprimento. As inflorescências masculinas são globosas, pedunculadas, inseridas na [axila](#) das folhas de ramos jovens. As inflorescências femininas são pedunculadas, constituídas por grupos de 1 a 3 flores com óvulos terminais, surgem em ramos produzidos no ano. Após fecundação ocorre o desenvolvimento das sementes a partir dos óvulos. Frutos drupáceos, carnudos, ovoides, com 2,5 a 3 cm, contendo 1 a 2 sementes. Sementes duras e lenhosas, rodeadas por um [tegumento carnudo](#), de cor [verde](#) que se torna castanho avermelhado após [maturação](#). A [maturação](#) decorre durante um período de 2 anos.

Tipo de Reprodução

[dióica](#)

Forma de Vida

[arbusto](#)

Ínicio de Floração

março

Fim de Floração

abril

Tipo de Fruto

[drupa](#)

Consistência do Fruto

[camudo](#)

Maturação do Fruto

setembro

Perenidade

perenifólia

Inflorescência

cone

(é o nome dado ao estróbilo de algumas Coníferas.)

Tipo de Folha

simples

(Folha em que o limbo constitui uma superfície contínua.)

Margem da Folha

inteira

(com a margem não recortada.)

Limbo da Folha

acicular

(ou acerosa, estreita, rígida e aguda, como as folhas do pinheiro, em forma de agulha fina.)

Habitat

Surge no [sub-bosque](#) de florestas de zonas montanhosas.

Observações

Multiplica-se através da [semente](#) que deve ser guardada até à Primavera. Também pode ser multiplicada por estacaria, no entanto, este é um [sistema](#) lento. Esta planta gosta de solos frescos e soltos, assim como de climas frescos. Resistente à poluição urbana.

O nome do género, *Cephalotaxus*, deriva do grego *kephale* e *taxus* que significa cabeça e teixo respectivamente, referindo-se desta forma às semelhanças entre estas plantas. O restritivo específico, *harringtonia*, resulta de uma dedicatória, no século XIX, ao conde de Harrington de Inglaterra.

Aplicações

É um [arbusto](#) semelhante ao teixo, [cultivado](#) como [ornamental](#) em alguns parques e jardins da Península Ibérica.

Porte



Folha



Flor



Tronco

