

# SERRAVES

---

*Pachygone laurifolia* (DC.) L.Lian & Wei Wang

### 3 Exemplares no Parque



### Família

Menispermaceae

## Nome Comum

cóculos, cóculo

## Origem

Nativa da Ásia Oriental até aos Himalaias.

## Tipo de Origem

[alóctone](#)

## Autor

(DC.) L.Lian & Wei Wang

## Descrição

O cóculo é um [arbusto](#) ou pequena [árvore sempre-verde](#), dioica, com 6 a 8 m de altura, muito ramificado e com [ramagem](#) aberta, algo [pendente](#). O [tronco](#) possui [casca](#) escura, fissurada. As folhas são [simples](#), alternas, dispostas em duas fileiras regulares sobre os ramos. Possuem uma forma [oblongo-ovada](#) ou obovada, às vezes elípticas, de 8 a 15 cm de comprimento e 3 a 5 cm de largura, com ponta acuminada; a margem é inteira, com 3 nervuras paralelas salientes; são [verde](#) lustrosas e de textura algo subcoriáceas. As flores são pequenas, esverdeadas, dispostas em inflorescências em forma de panículas axilares ou terminais. O fruto é uma [drupa](#), globosa, achatada e negra, com cerca de 6 mm de diâmetro.

## Tipo de Reprodução

[dióica](#)

## Forma de Vida

[árvore](#)

## Início de Floração

maio

## Fim de Floração

junho

## Tipo de Fruto

[drupa](#)

## Consistência do Fruto

[camudo](#)

## **Maturação do Fruto**

setembro

## **Perenidade**

perenifólia

## **Inflorescência**

panícula

(inflorescência composta racemosa, de forma geralmente cónica ou piramidal, isto é, mais larga na base.)

## **Cor da Flor**

verde

## **Tipo de Folha**

simples

(Folha em que o limbo constitui uma superfície contínua.)

## **Inserção de Folha**

alterna

(quando existe uma folha em cada nó.)

## **Margem da Folha**

inteira

(com a margem não recortada.)

## **Limbo da Folha**

oblongo-ovado

(folha em forma de elipse alongada, mas com a base mais larga e arredondada, isto é, de secção longitudinal semelhante a um ovo.)

## **Habitat**

Estrato inferior de florestas mistas (até 6 m de altura no [habitat natural](#))

## **Observações**

[Espécie](#) que cresce bem em locais frescos e sombrios; resistente à geada e de crescimento lento, sendo muito difícil de reproduzir em viveiros (multiplica-se por meio de sementes). O género *Cocculus* compreende 7 espécies distribuídas principalmente [pelos](#) trópicos de África e este da Ásia. O restritivo específico, *laurifolius*, é alusivo às suas folhas, semelhantes as do loureiro (*Laurus nobilis*).

## Aplicações

Muito cultivada para fins ornamentais, principalmente devido às suas vistosas folhas que apresentam 3 nervuras inconfundíveis. Um alcaloide da [casca](#) tem efeito de relaxante muscular, semelhante ao do curare. A planta também tem sido utilizada como diurética e vermífuga.

## Porte



**Folha**



**Flor**



## Tronco

