

SERRAVES

Pleroma urvilleanum (DC.) P.J.F.Guim. & Michelang.

9 Exemplos no Parque



Família

Melastomataceae

Nome Comum

tiboquina, quaresmeira-anã-roxa, quaresmeira, quaresmeira-anã, aranhas

Origem

América do Sul (originária do Brasil).

Tipo de Origem

[alóctone](#)

Autor

(DC.) P.J.F.Guim. & Michelang.

Descrição

A *Pleroma urvilleanum* é um [arbusto](#) ou pequena [árvore](#) com cerca de 1 a 4 m de altura, tardiamente caduca ([marcescente](#)). Os ramos são quadrangulares, as folhas [ovado-elípticas](#) ou lanceoladas, com 4 a 12 cm de comprimento por 2 a 5 cm de largura, com 5 a 7 nervuras, margem inteira e [ápice acuminado](#), base obtusa ou arredondada e pecíolos com 5 a 20 mm de comprimento. Inflorescências terminais com cerca de 8 a 15 cm de comprimento, tipo cimeiras [simples](#); [cálice](#) com os lóbulos lineares, com 12 a 15 mm de comprimento, [caduco](#); [corola](#) com 5 pétalas, purpúreas, 25 a 40 mm comprimento; estames dimórficos. Os frutos são cápsulas deiscentes no [ápice](#).

Tipo de Reprodução

[hermafrodita](#)

Forma de Vida

[arbusto](#)

Início de Floração

julho

Fim de Floração

setembro

Tipo de Fruto

[cápsula](#)

Consistência do Fruto

seco

Maturação do Fruto

novembro

Perenidade

[marcescente](#)

Inflorescência

cimeira

(inflorescência com o eixo principal de crescimento limitado, no prolongamento do pedúnculo, de onde partem eixos secundários, terminando todos numa flor, que variam em número e ramificações, podendo ser uníparas, bíparas ou múltiparas.)

Cor da Flor

violeta

Tipo de Folha

simples

(Folha em que o limbo constitui uma superfície contínua.)

Inserção de Folha

oposta

(quando existem duas folhas em cada nó.)

Margem da Folha

inteira

(com a margem não recortada.)

Limbo da Folha

lanceolado

(em forma de ferro de lança, mais largo no meio e estreitando gradualmente para as extremidades.)

Habitat

Floresta tropical do sul do Brasil.

Observações

O género *Pleroma* compreende cerca de 170 espécies distribuídas pela América Central e América do Sul. Devido à imensa utilização como [espécie ornamental](#), existem diversas cultivares resultantes de cruzamentos entre espécies utilizadas como ornamentais, sendo por vezes difícil identificá-las. Naturalizada na América do Sul e Nova Zelândia.

Aplicações

Pleroma urvilleanum é uma espécie muito utilizada como ornamental em parques e jardins, sendo cultivada em locais quentes. Muito atrativa pela sua folhagem macia e vistosas flores roxas.

Porte



Folha



Flor



Tronco

