

SERRAVES

Prunus armeniaca L.

4 Exemplos no Parque



Família

Rosaceae

Nome Comum

damasqueiro, albricoqueiro, alperceiro, alpercheiro

Origem

Ásia Central e China. Largamente cultivado como árvore de fruta.

Tipo de Origem

[alóctone](#)

Autor

L.

Descrição

O damasqueiro é uma pequena [árvore](#) de 3 a 6 m de altura, de [copa](#) arredondada, [inerme](#) ou algo espinhosa, glabra, exceto na [flor](#) e no fruto. [Tronco](#) recto e [robusto](#), coberto por [casca](#) castanho-escura, algo fissurada. Raminhos vermelho-acastanhados, com folhas alternas, largamente ovadas ou suborbiculares, cuspidadas e serradas. Flores solitárias ou em fascículos de 2(6), subsésseis, de [cálice piloso](#), pétalas com 10 a 15 mm, brancas ou rosadas, muito pálidas. As flores são hermafroditas, possuem numerosos estames e um [pistilo](#). O fruto é uma [drupa](#) com 4 a 8 cm de diâmetro, subglobosa, aveludada, vermelho-alaranjado a amarela; mesocarpo amarelo-alaranjado e [endocarpo](#) lenticular, [liso](#), com 3 costas finas ao longo duma das margens.

Tipo de Reprodução

[hermafrodita](#)

Forma de Vida

[árvore](#)

Início de Floração

março

Fim de Floração

maio

Tipo de Fruto

[drupa](#)

Consistência do Fruto

[camudo](#)

Maturação do Fruto

dezembro

Perenidade

caducifólia

Inflorescência

solitária

(diz-se de uma flor que está isolada, na axila da folha ou na extremidade do caule.)

Cor da Flor

cor de rosa

Tipo de Folha

simples

(Folha em que o limbo constitui uma superfície contínua.)

Inserção de Folha

alterna

(quando existe uma folha em cada nó.)

Margem da Folha

serrada

(com dentes marginais agudos e próximos, como os de uma serra, dirigidos para o ápice da folha.)

Limbo da Folha

ovado

(contorno semelhante ao corte longitudinal dum ovo.)

Habitat

Existem povoamentos silvestres no Tibete, nas encostas das montanhas em florestas esparsas de altitudes (700 a 3000 m).

Observações

O damasqueiro, cujos frutos são geralmente pequenos e ácidos, cresce espontaneamente na [região](#) que se estende do Irão à Manchúria. A [árvore](#) começou a ser cultivada nos pomares chineses 3 séculos antes de Cristo. Do Extremo Oriente propagou-se à Ásia Ocidental, e, devido ao seu enorme desenvolvimento na Arménia, os Romanos chamaram-lhe *Armeniacum malum*, maça-da-Arménia. Citado [pelos](#) Romanos desde o séc. I, o damasqueiro foi difundido por todos os territórios invadidos da bacia mediterrânica. É actualmente uma das árvores de fruto mais cultivadas nas regiões meridionais da Europa, podendo os seus frutos ser consumidos quer frescos quer secos.

Aplicações

O damasco é um fruto de grande valor nutritivo. Especialmente rico em provitamina A, à qual se associam outras vitaminas, açúcares, sais minerais e numerosos oligoelementos, sendo, efetivamente um poderoso anti-anémico. O damasco é geralmente bem tolerado, podendo, porém, como o morango, provocar reacções alérgicas. Consumido cru, é antidiarreico, mas depois de seco e submetido à mesma preparação que as ameixas tornam-se [laxante](#). O sumo fresco, aplicado no rosto sob a forma de loção, é um excelente tónico. A amêndoa do [caroço](#), bastante oleaginosa, é comestível se for doce; porém é mais frequente ser amarga, contendo, nesse caso, uma substância que produz ácido cianídrico, um veneno violento. Deve ter-se a maior prudência, pois este [caroço](#) já provocou acidentes mortais, especialmente em crianças.

Porte



Folha



Flor



Tronco

