

SERRAVES

Acacia retinodes Schltdl.

4 Exemplos no Parque



Família

Fabaceae

Nome Comum

acácia, acácia-virilda

Origem

Originária da Oceânia (Sul da Austrália)

Tipo de Origem

[alóctone](#)

Autor

Schltl.

Descrição

A [espécie](#) *Acacia retinodes* é um [arbusto](#) elevado ou [árvore](#) com até 8 (10) m de altura, [inorme, sempre-verde](#), com [ritidoma liso](#) e cinzento. Os ramos são eretos patentes, subcilíndricos ou trigonais, glabros e de cor escura. As folhas estão todas reduzidas a filódios, [verde-claros](#) a glaucos, estreitamente lanceolados ou quase lineares, [pontigudos](#) ou quase obtusos, de rectos ou ligeiramente curvados até bastante curvados e falciformes, com uma só [nervura](#) longitudinal e nervuras secundárias pinadas. Possuem uma [glândula](#) que dista mais ou menos 6 a 10 mm da base. A [inflorescência](#) está disposta em glomérulos globosos com 20 a 30 flores amarelo-pálidas, pedunculadas, agrupada em capítulos, que nascem da [axila](#) das folhas. Brácteas persistentes e pilosas. As flores têm [cálice](#) e [corola tubular](#), com as peças soldadas em tubo e numerosos estames (mais de 10), com filamentos livres ou unidos só na base, compridos e vistosos, que ultrapassam o [perianto](#). Os frutos são vagens, elipsoides, comprimidas, mais ou menos rectas, pouco contraídas entre as sementes, agudas no [ápice](#) e de cor castanha. Sementes elipsoides, mais ou menos comprimidas e castanho-acinzentadas.

Tipo de Reprodução

[hermafrodita](#)

Forma de Vida

[árvore](#)

Ínicio de Floração

fevereiro

Fim de Floração

outubro

Tipo de Fruto

[vagem](#)

Consistência do Fruto

seco

Maturação do Fruto

outubro

Perenidade

perenifólia

Inflorescência

glomérulo

(aglomerado de flores ou de frutos com os pecíolos curtos. Cimeira multiflora, muito contraída, frequentemente globosa ou subglobosa.)

Cor da Flor

amarelo

Tipo de Folha

simples

(Folha em que o limbo constitui uma superfície contínua.)

Inserção de Folha

alterna

(quando existe uma folha em cada nó.)

Margem da Folha

inteira

(com a margem não recortada.)

Limbo da Folha

lanceolado

(em forma de ferro de lança, mais largo no meio e estreitando gradualmente para as extremidades.)

Tendência Biogeográfica

Temperado

Habitat

Florestas de interior, abertas em solos mal drenados.

Observações

O restritivo específico, *retinodes*, significa “resinosa” e deve-se ao facto de se obter, desta acácia, no seu país de origem, uma goma. As “folhas simples” próprias desta acácia e de outras acácias australianas, por vezes curvadas e falciformes, são na realidade falsas folhas denominadas de filódios (pecíolo laminar e achatado, com aspecto de limbo foliar e desempenhando a função deste). Na maioria das espécies que apresentam este fenómeno, as folhas jovens são no entanto compostas, pinuladas ou bipinuladas. Existem outras espécies, em que as folhas são reduzidas a filódios, a *Acacia melanoxylon* R. Br. (acácia austrália) e a *Acacia longifolia* (Andrews) Willd. (acácia de espigas), também frequentes no nosso país.

Aplicações

Tal como as outras acácias, a espécie *Acacia retinodes*, é rica em taninos, sendo por isso vulgarmente utilizada, na Austrália, para curtir couros.

Porte



Folha



Flor



Tronco

