

# SERRAVES

---

*Quercus coccinea* Münchh.

**34 Exemplares no Parque**



**Família**

Fagaceae

**Nome Comum**

carvalho-de-scarlet, carvalho-escarlata

**Origem**

América do Norte e Central.

**Tipo de Origem**

[alóctone](#)

**Autor**

Münchh.

**Descrição**

O carvalho-de-scarlet é uma [árvore](#) que pode atingir 20 a 25 m de altura. [Copa](#) ampla, frouxamente [piramidal](#). Folhas [simples](#), alternas, oblongas ou elípticas, 10 a 18 cm de comprimento, profundamente fendidas em 7 a 9 lobos largos, dentados. [Limbo glabro, verde-lustroso](#) na [página](#) superior; os recortes entre os lóbulos são em forma de 'C'. Flores masculinas reunidas em amentilhos. Os frutos são glandes subsésseis (1,5 a 2 cm), ovóides, com uma [cúpula](#). A [maturação](#) é bienal.

**Tipo de Reprodução**

[monóica](#)

**Forma de Vida**

[árvore](#)

**Ínicio de Floração**

abril

**Fim de Floração**

maio

**Tipo de Fruto**

[glande](#)

**Consistência do Fruto**

seco

**Maturação do Fruto**

setembro

## **Perenidade**

caducifólia

## **Inflorescência**

amentilho

((ou amento) inflorescência em forma de espiga, geralmente pendente e formada por flores unissexuadas e nuas, ou com o perianto sepalóide, que se destaca pela base do eixo.)

## **Cor da Flor**

verde

## **Tipo de Folha**

simples

(Folha em que o limbo constitui uma superfície contínua.)

## **Inserção de Folha**

alterna

(quando existe uma folha em cada nó.)

## **Margem da Folha**

inteira

(com a margem não recortada.)

## **Limbo da Folha**

fendido

(dividido até cerca de meio do limbo.)

## **Habitat**

Florestas e bosques de carvalhos, em solos arenosos, geralmente com pouca humidade.

## **Aplicações**

Espécie muito apreciada como ornamental, utilizada em parques e jardins pela coloração vermelho-vivo da folhagem no outono, antes de caírem as folhas.

**Porte**



**Folha**



## Tronco

