

Paulownia tomentosa (Thunberg) Steudel

4 Exemplos no Parque



Família

Paulowniaceae

Nome Comum

[árvore-da-imperatriz](#), paulónia, [árvore-da-princesa](#)

Origem

Ásia Oriental (Centro e Oeste da China, naturalizada desde há muito no Japão).

Tipo de Origem

[alóctone](#)

Autor

(Thunberg) Steudel

Descrição

A *Paulownia tomentosa* é uma [árvore](#) caducifólia, de até 15(20) m de altura, de [casca](#) cinzenta ou castanho-acinzentada e [copa](#) ampla, mais ou menos arredondada. Tem as folhas opostas, [pecíolo](#) comprido, ovadas ou em forma de coração na base, inteiras, angulosas ou ocasionalmente 3-5 lobadas, sobretudo em exemplares jovens, muito grandes (de 12 a 30 por 12 a 27 cm), tomentosas na [página](#) superior e inferior. As inflorescências são panículas grandes, erectas, piramidais, com os ramos cobertos de pêlos acastanhados. As flores são hermafroditas, irregulares, aromáticas, grandes e vistosas, com [cálice](#) de 1,5 a 2 cm, [campanulado](#), [fendido](#) até metade em 5 lóbulos triangulares, coberto de pêlos. Possui 4 estames que ficam ocultos no interior do tubo da [corola](#), desiguais, 2 mais compridos que os outros dois (didinâmicos). O [ovário](#) é súpero, ovóide-cónico, coberto de pequenos [pelos](#) glandulíferos, com 2 cavidades; o [estilete](#) é [simples](#), algo arqueado. O fruto é uma [cápsula](#) seca, de 3-4,5 cm, ovóide, pontiaguda, que se abre por 2 valvas. As sementes são numerosas, rodeadas por uma [asa](#) estriada.

Tipo de Reprodução

[hermafrodita](#)

Forma de Vida

[árvore](#)

Ínicio de Floração

abril

Fim de Floração

junho

Tipo de Fruto

[cápsula](#)

Consistência do Fruto

seco

Maturação do Fruto

setembro

Perenidade

caducifólia

Inflorescência

panícula

(inflorescência composta racemosa, de forma geralmente cónica ou piramidal, isto é, mais larga na base.)

Cor da Flor

violeta

Tipo de Folha

simples

(Folha em que o limbo constitui uma superfície contínua.)

Inserção de Folha

oposta

(quando existem duas folhas em cada nó.)

Margem da Folha

inteira

(com a margem não recortada.)

Limbo da Folha

ovado

(contorno semelhante ao corte longitudinal dum ovo.)

Habitat

Presente em muitas províncias da China, em solos profundos e bem drenados, normalmente em florestas caducifólias temperadas, abaixo dos 1800 m.

Observações

O género *Paulownia* tem pouco mais de uma dezena de espécies, toda caducifólias, do este da Ásia. São de crescimento rápido, mas sensíveis às geadas.

As folhas são semelhantes às da *Catalpa bignonioides*. No inverno a *Paulownia tomentosa* reconhece-se pelas suas gemas florais, grandes, globulares, pilosas, que aparecem logo no final do Verão anterior à [floração](#), e [pelos](#) frutos que na *Paulownia* são ovóides, muito diferentes das compridas vagens pendentes, das catalpas. Contudo, florescem em épocas diferentes, a *Paulownia*, possui uma [floração](#) mais [precoce](#), enquanto a catalpa só floresce lá para junho ou julho. O restritivo específico *tomentosa* significa com [pelos](#), alusivo às folhas e caules cobertos de [pelos](#).

Aplicações

Usada como [ornamental](#) em muitas ruas, jardins e parques. A madeira da *Paulownia tomentosa* é de muito boa qualidade, apreciada em marcenaria no Oriente, sobretudo na China e Japão. As sementes eram usadas, à semelhança do esferovite, para proteger as porcelanas durante o transporte. Considerada uma planta [invasora](#) em alguns países, como é o caso dos Estados Unidos da América, onde ameaça as plantas nativas.

Porte



Folha



Flor



Fruto



Tronco

