

SERRAVES

Viburnum odoratissimum Ker Gawl.

3 Exemplares no Parque



Família

Viburnaceae

Nome Comum

viburno-cheiroso, viburno, viburno-doce

Origem

Ásia (China, Japão e Ásia Tropical (Índia, Malásia, Tailândia e Vietname)).

Tipo de Origem

[alóctone](#)

Autor

Ker Gawl.

Descrição

O *Viburnum odorantissimum* é um [arbusto](#) elevado ou [árvore, sempre-verde](#), que pode atingir 10 m de altura. As folhas são grandes, de ovadas a obovadas, [verde-brilhantes](#), opostas, com cerca de 14 cm de comprimento, coriáceas, toscamente dentadas. Flores brancas, pequenas, agradavelmente perfumadas, dispostas em panículas grandes, agrupadas em panículas terminais. Os frutos são drupas que passam de vermelho a negras na [maturação](#).

Tipo de Reprodução

[hermafrodita](#)

Forma de Vida

[arbusto](#)

Início de Floração

abril

Fim de Floração

julho

Tipo de Fruto

[drupa](#)

Consistência do Fruto

[carnudo](#)

Maturação do Fruto

agosto

Perenidade

perenifólia

Inflorescência

panícula

(inflorescência composta racemosa, de forma geralmente cónica ou piramidal, isto é, mais larga na base.)

Cor da Flor

branco

Tipo de Folha

simples

(Folha em que o limbo constitui uma superfície contínua.)

Inserção de Folha

oposta

(quando existem duas folhas em cada nó.)

Margem da Folha

dentada

(provida de dentes mais ou menos perpendiculares à linha da margem.)

Limbo da Folha

ovado

(contorno semelhante ao corte longitudinal dum ovo.)

Habitat

Áreas florestais até 1200 m.

Observações

As espécies autóctones e aclimadas do género *Viburnum* encontram-se entre os arbustos de jardim mais decorativos. Os seus frutos são venenosos para o homem, apesar do bom aspecto que têm. Somente os pássaros e pequenos mamíferos podem comê-los sem que qualquer mal lhes aconteça.

Aplicações

No centro e sul da Florida, o *Viburnum odoratissimum* é usado para controlo de ruído, frequentemente plantada como sebe entre habitações e nas auto-estradas.

Porte



Folha



Flor



Fruto



Tronco

