

SERRAVES

Euonymus japonicus Thunb. 'Variegata'

20 Exemplares no Parque



Família

Celastraceae

Nome Comum

evónio-dos-jardins, evónio-do-japão, evónio

Origem

Ásia oriental (Japão, China, Coreia e mais a Sul na Indonésia e Filipinas).

Tipo de Origem

[alóctone](#)

Autor

Thunb.

Descrição

Euonymus japonicus cv. 'Variegata' é uma [cultivar](#) que forma geralmente pequenos arbustos [sempre-verdes](#), que se reconhecem pelas suas folhas maculadas de um amarelo esbranquiçado; são persistentes, grossas e coriáceas, muito lustrosas na [página](#) superior, obovadas ou elípticas, geralmente obtusas, (raramente obtusas), serradas, com dentes relativamente grandes. Flores pequenas, dispostas em racimos. Frutos globosos (cápsulas) com 4 lobos cada e 7-9 mm de diâmetro, sementes brancas providas de [arilo](#) alaranjado.

Tipo de Reprodução

[hermafrodita](#)

Forma de Vida

[arbusto](#)

Início de Floração

maio

Fim de Floração

julho

Tipo de Fruto

[cápsula](#)

Consistência do Fruto

seco

Maturação do Fruto

setembro

Perenidade

perenifólia

Inflorescência

racimo

(o mesmo que cacho.)

Cor da Flor

amarelo

Tipo de Folha

simples

(Folha em que o limbo constitui uma superfície contínua.)

Inserção de Folha

oposta

(quando existem duas folhas em cada nó.)

Margem da Folha

serrada

(com dentes marginais agudos e próximos, como os de uma serra, dirigidos para o ápice da folha.)

Limbo da Folha

obovado

(contorno semelhante ao corte longitudinal dum ovo, mas com a parte mais larga junto ao ápice.)

Habitat

Característica de florestas e [matagais](#) temperados ou tropicais do Leste asiático, em encostas de pequenas colinas, próximo do mar.

Observações

Existem muitas cultivares, que diferem no tom das folhas.

Aplicações

[Espécie](#) utilizada como planta [ornamental](#), principalmente para formar sebes. É considerada uma planta bastante tóxica.

Porte



Folha



Flor



Fruto



Tronco

