

# SERRAVES

---

*Chamaecyparis obtusa* (Siebold & Zuccarini) Endlicher

**3 Exemplares no Parque**



**Família**

Cupressaceae

**Nome Comum**

falso-cipreste-anão, tuia-degenerada

**Origem**

Ásia (Japão).

**Tipo de Origem**

[alóctone](#)

**Autor**

(Siebold & Zuccarini) Endlicher

**Descrição**

O falso-cipreste-anão é uma [árvore](#) que pode atingir 30 m de altura e 3 m de diâmetro. O seu [tronco](#) erecto possui [casca](#) castanha e fibrosa, fissurada. Folhas densamente imbricadas, agudas e obtusas, [verde-escuras](#) e com a margem mais esbranquiçada. Inflorescências em cones globosos, com 8 a 12 mm de diâmetro, com 8 a 10 escamas. Sementes com cerca de 3 mm de comprimento, acastanhadas.

**Tipo de Reprodução**

[monóica](#)

**Forma de Vida**

[árvore](#)

**Tipo de Fruto**

[pinha](#)

**Consistência do Fruto**

seco

**Perenidade**

perenifólia

**Inflorescência**

cone

(é o nome dado ao estróbilo de algumas Coníferas.)

**Cor da Flor**

amarelo

## Tipo de Folha

simples

(Folha em que o limbo constitui uma superfície contínua.)

## Inserção de Folha

imbricada

(que, estando muito próximo de outros os cobre parcialmente, como as telhas dum telhado ou as escamas dos peixes, revestindo o seu conjunto uma superfície.)

## Margem da Folha

inteira

(com a margem não recortada.)

## Limbo da Folha

agudo

(folha cujas margens confluem no ápice segundo um ângulo agudo.)

## Habitat

Ocorre em florestas de [coníferas](#) ou mistas, em que as [coníferas](#) são dominantes e as angiospermas formam no estrato [arbóreo](#), as camadas mais inferiores.

## Observações

Conhecida vulgarmente no Japão por Hinoki, é cultivada nesse país pela sua madeira de alta qualidade, sendo utilizada na construção de palácios, templos, santuários, etc. O Templo Horyuji e o Castelo de Osaka foram construídos a partir de madeira Hinoki.

A madeira tem cor castanho-clara, ligeiramente rosada e aroma a limão.

*Chamaecyparis obtusa* pertence à família das *Cupressaceae*, assim como os *Cupressus*, distinguindo-se fundamentalmente destes por terem uma [folhagem](#) menos homogénea, com ramos achatados (com folhas laterais e faciais) e gálbulas ou cones mais pequenas, de [maturação anual](#) com 2 a 5 sementes por [escama](#). Devido a esta grande semelhança com os *Cupressus* (ciprestes), são conhecidos vulgarmente por falsos-ciprestes.

## Aplicações

É uma [árvore ornamental](#) popular em parques e jardins, tanto no Japão como em outros lugares em climas temperados, incluindo Europa Ocidental e partes da América do Norte. Um grande número de cultivares foram selecionadas para o plantio de jardim, incluindo formas anãs, formas com as folhas amarelas e formas com densa [folhagem](#). Também é frequentemente cultivada como bonsai.



**Porte**





**Folha**



## Tronco

