

# SERRAVES

---

*Crataegus laevigata* (Poiret) de Candolle 'Roseoplena'

**2 Exemplares no Parque**



**Família**

Rosaceae

## Nome Comum

pilriteiro-rosa, espinheiro, escalheiro

## Origem

A área de distribuição de *Crataegus laevigata* compreende a Europa central, principalmente norte da Península Ibérica, Sicília, Roménia até às Ilhas Britânicas e sul da Suécia.

## Tipo de Origem

[alóctone](#)

## Autor

(Poiret) de Candolle

## Descrição

O pilriteiro-rosa é um [arbusto](#) ou pequena [árvore](#), que pode chegar aos 8 m de altura. Possui folhas [simples](#), alternas, com [pecíolo](#) bem desenvolvido e lâmina obovada, espatulada, fendida mais ou menos profundamente em 3 a 7 lóbulos desiguais e estreitando, em forma de cunha, na base. A sua [inflorescência](#) é em corimbos, de flores dobradas com várias pétalas rosadas, onduladas. O fruto é um pirenário, [globoso](#) ou ovóide, vermelho-vivo, coroado por sépalas deflexas geralmente um pouco mais compridas que largas; com uma só [semente](#), não comestível.

## Tipo de Reprodução

[hermafrodita](#)

## Forma de Vida

[arbusto](#)

## Início de Floração

abril

## Fim de Floração

junho

## Tipo de Fruto

pirenário

## Consistência do Fruto

[camudo](#)

## **Maturação do Fruto**

setembro

## **Perenidade**

caducifólia

## **Inflorescência**

corimbo

(inflorescência tipo cacho, na qual as flores, devido ao desigual comprimento dos eixos (os inferiores muito mais longos), se situam mais ou menos ao mesmo nível. O corimbo também pode ser simples ou composto.)

## **Cor da Flor**

cor de rosa

## **Tipo de Folha**

simples

(Folha em que o limbo constitui uma superfície contínua.)

## **Inserção de Folha**

alterna

(quando existe uma folha em cada nó.)

## **Margem da Folha**

lobulada

(que está dividido em lóbulos (recortes pouco profundos, que não chega a metade do órgão).)

## **Limbo da Folha**

obovado

(contorno semelhante ao corte longitudinal dum ovo, mas com a parte mais larga junto ao ápice.)

## **Habitat**

Clareiras e orlas de florestas de carvalhos e faias.

## **Observações**

O pilriteiro-rosa é também conhecido como [“flor-de-maio”](#), importante nos ritos associados a algumas festas em França e Inglaterra.

O nome do género provém do adjectivo grego *Krataios*: forte, [robusto](#), alusivo à sua madeira que é duríssima, e muito resistente, de cor branca ou rosada, apreciada em tornearia e boa como combustível e para fabrico do carvão.

## Aplicações

São atribuídas ao pilriteiro-rosa propriedades antiespasmódicas, diuréticas e sedativas. É conhecido como “valeriana-do-coração”, tendo bons resultados no tratamento de problemas cardiovasculares. As flores do pilriteiro-rosa utilizadas em infusões regulam a pressão arterial e agem como um estimulante cardíaco (melhorando as contrações do músculo cardíaco). A [espécie](#) tem também propriedades diuréticas, sendo eficiente no tratamento da hidropisia e em problemas renais. As flores e frutos são adstringentes. Usados em decocção, são ainda úteis no tratamento de dores de garganta.

## Porte



**Folha**



**Flor**



**Fruto**





## Tronco

