

SERRAVES

Ligustrum ovalifolium Hassk. 'Aureo-marginatum'

8 Exemplos no Parque



Família

Oleaceae

Nome Comum

[alfenheiro-oval](#), ligustro-aurea

Origem

Cultivar.

Tipo de Origem

[alóctone](#)

Autor

Hassk.

Descrição

[Arbusto](#) de 1 a 3 m, que raras vezes alcança os 5 m e apenas perde as folhas em invernos mais rigorosos. Folhas [elíptico-ovadas](#) ou oblongas, curtamente pediceladas, verdes e marginadas de tons amarelados, o que identifica a [cultivar](#). Flores hermafroditas, pequenas, em panículas terminais, [cálice campanulado, 4-lobado](#). [Corola](#) assalveada, claramente mais larga que os lóbulos, branca. As flores possuem um odor algo desagradável. O fruto é uma [drupa](#) negra na [maturação](#).

Tipo de Reprodução

[hermafrodita](#)

Forma de Vida

[arbusto](#)

Índice de Floração

março

Fim de Floração

junho

Tipo de Fruto

[drupa](#)

Consistência do Fruto

[camudo](#)

Maturação do Fruto

setembro

Perenidade

perenifólia

Inflorescência

panícula

(inflorescência composta racemosa, de forma geralmente cônica ou piramidal, isto é, mais larga na base.)

Cor da Flor

branco

Tipo de Folha

simples

(Folha em que o limbo constitui uma superfície contínua.)

Inserção de Folha

oposta

(quando existem duas folhas em cada nó.)

Margem da Folha

inteira

(com a margem não recortada.)

Limbo da Folha

obovado

(contorno semelhante ao corte longitudinal dum ovo, mas com a parte mais larga junto ao ápice.)

Habitat

[Cultivar.](#)

Observações

O nome genérico, *Ligustrum*, era já utilizado [pelos](#) Romanos e foi mantido por Lineu; segundo alguns autores deriva do vocábulo latino *ligere*, que significa atar, por os seus ramos terem sido utilizados com este fim.

Aplicações

Apreciada [pelos](#) tons das suas folhas, é muito utilizada como [ornamental](#) para formar sebes, suportando muito bem podas.

Folha



Flor

