

# SERRAVES

---

*Pyrus communis* L. subsp. *pyraster*

## 7 Exemplares no Parque



**Família**

Rosaceae

**Nome Comum**

pereira-brava

**Origem**

Cáucaso e este da Europa.

**Tipo de Origem**

[alóctone](#)

**Autor**

L.

**Descrição**

A pereira brava é uma [árvore](#) de [folha](#) caduca, até 12 m de altura. [Casca](#) cinzenta-acastanhada, lisa quando jovem e reticulada a fendida mais tarde, com robustos espinhos nas extremidades dos ramos. Folhas orbiculares a ovadas com [pecíolo](#) fino e mas comprido que o comprimento da [folha](#), [ápice agudo](#) e frequentemente truncadas na base. Margem crenulada ou finamente serrilhada, quase inteira. Flores reunidas em corimbos na extremidade dos ramos, tomentosos na rebentação e glabros na [frutificação](#). Flores brancas com cerca de 2,5 cm de diâmetro. Fruto é um [pomo, globoso](#) a turbinado, geralmente coroadado pelo [cálice marcescente, pardo](#) e com [pedúnculo](#) grosso e rígido

**Tipo de Reprodução**

[hermafrodita](#)

**Forma de Vida**

[árvore](#)

**Início de Floração**

abril

**Fim de Floração**

junho

**Tipo de Fruto**

[pomo](#)

**Consistência do Fruto**

[camudo](#)

## **Maturação do Fruto**

julho

## **Perenidade**

caducifólia

## **Inflorescência**

corimbo

(inflorescência tipo cacho, na qual as flores, devido ao desigual comprimento dos eixos (os inferiores muito mais longos), se situam mais ou menos ao mesmo nível. O corimbo também pode ser simples ou composto.)

## **Cor da Flor**

branco

## **Tipo de Folha**

simples

(Folha em que o limbo constitui uma superfície contínua.)

## **Inserção de Folha**

alterna

(quando existe uma folha em cada nó.)

## **Margem da Folha**

crenada

(provida de corte arredondados na margem)

## **Limbo da Folha**

orbicular

(ou arredondada, de contorno arredondado, circular, com razão comprimento/largura igual à unidade.)

## **Habitat**

Sebes, bosques e matas luminosos.

## **Observações**

*Pyrus communis* reúne um variado grupo de formas diferenciadas essencialmente pelas formas de cultura, com melhor sabor do fruto (pera) e mais doce (*P. communis*; *P. communis* var. *sativa*) e pelas formas selvagens, com peras mais ásperas, pequenas e de sabor acre (*P. communis* subsp. *pyraster*). Nem todos os autores aceitam a subsp. *pyraster* como válida. Seguimos os autores que aceitam esta subespécie, porque em Serralves há dois tipos muito distintos de *Pyrus communis*, sendo que a subsp. *pyraster* possui [folha](#) mais arredondadas com pecíolos muito compridos e fruto de menores dimensões.

## Aplicações

Os seus frutos, as peras são nitidamente mais pequenas que as das formas cultivares, de cor amarelo a vermelho e comestíveis, mas muito duras e ácidas.

## Porte





**Folha**



**Flor**



**Fruto**



## Tronco

