

*Taxus baccata* L. 'Repens'

## 19 Exemplares no Parque



**Família**

Taxaceae

## Nome Comum

teixo-rasteiro, [teixo-de-porte-rasteiro](#)

## Origem

A espécie nativa, *Taxus baccata*, é oriunda da Europa, oeste da Ásia e norte de África.

## Tipo de Origem

[alóctone](#)

## Autor

L.

## Descrição

Esta [cultivar](#) obtida a partir da [espécie](#) *Taxus baccata*, distingue-se pelo [porte](#) rasteiro. É um [arbusto](#) de [folhagem verde-escuro](#) e [persistente](#). Possui o [tronco](#) grosso, com [casca](#) castanha-avermelhada escura que se desprende em tiras ou placas. Produz grande número de ramos estendidos e quase horizontais. As folhas são lineares, [verde-escuras](#), glabras, curtamente pecioladas, alternas, dispostas num plano (dísticas), por torção do [pecíolo](#), com a [nervura](#) média algo saliente na face inferior e que termina num pequeno [mucrão](#). É uma [espécie](#) dioica, os exemplares masculinos produzem os cones na [axila](#) das folhas, amarelos, formados por 6 a 14 escamas polínicas que se elevam num pé, de contorno poligonal; estão protegidos inferiormente por um [invólucro](#) de brácteas alaranjadas. Nos teixos femininos as inflorescências são solitárias e nascem na [axila](#) das folhas, têm forma [ovoide](#) e estão rodeadas na base por uma [bráctea verde](#), fazendo lembrar uma pequena bolota. Esta [bráctea](#) desenvolve-se na [maturação](#) para formar um [invólucro carnudo](#) vermelho que rodeia quase completamente a [semente \(arilo\)](#), vermelha quando madura, vistosa e adocicada, mas tóxica. Os frutos têm uma [maturação anual](#).

## Tipo de Reprodução

[dióica](#)

## Forma de Vida

[arbusto](#)

## Ínicio de Floração

março

## Fim de Floração

abril

## Tipo de Fruto

pseudo-fruto

## Consistência do Fruto

[camudo](#)

## Maturação do Fruto

setembro

## Perenidade

perenifólia

## Inflorescência

cone

(é o nome dado ao estróbilo de algumas Coníferas.)

## Cor da Flor

laranja

## Tipo de Folha

simples

(Folha em que o limbo constitui uma superfície contínua.)

## Inserção de Folha

dística

(quando as folhas se dispõem em duas filas opostas, de um e outro lado de um eixo comum)

## Margem da Folha

inteira

(com a margem não recortada.)

## Limbo da Folha

linear

(estreita e comprida com as margens paralelas em grande extensão.)

## Habitat

[Taxa](#) obtida em viveiro a partir da [espécie](#) *Taxus baccata*.

## Observações

Como [espécie ornamental](#) é utilizada em parques e jardins, pelo [porte](#) que exibe e pelas formas e desenhos que pode proporcionar. No Parque de Serralves, além desta [cultivar](#), podemos encontrar a [cultivar](#) 'Fastigiata', com as folhas dispostas em [espiral](#) ao longo dos ramos e [porte colunar](#).

## Aplicações

Tal como o *Taxus baccata*, esta [cultivar](#) é uma planta muito tóxica exceto o [arilo carnudo](#) que serve de alimento às aves que a disseminam (como o pombo torcaz).

## Porte





**Folha**



## Tronco

