

# SERRAVES

---

*Hesperocypris lusitanica* (Mill.) Bartel

**108 Exemplares no Parque**



**Família**

Cupressaceae

## Nome Comum

cedro-do-bussaco, cedro-de-goá, falso-cedro-do-buçaco, cipreste-do-buçaco

## Origem

América Central (México, Guatemala e Costa Rica)

## Tipo de Origem

[alóctone](#)

## Autor

(Mill.) Bartel

## Descrição

O cedro-do-buçaco é uma [árvore](#) que pode atingir 30 m de altura, de [tronco](#) cilíndrico, muito direito, de [casca](#) acastanhada e longitudinalmente fendida. Diferencia-se pelas suas folhas aguçadas, com o [ápice](#) levantado, verdes ou glaucas, que dão um tacto [áspero](#) aos raminhos; as folhas são providas de uma [glândula](#) pequena e [oval](#) na parte mediana. Os ramos são divergentes, mais ou menos pendentes nas extremidades. O fruto ([gálbula](#)) possui 10 a 15 mm é [globoso](#), [glaucó](#) em novo e castanho-brilhante na [maturação](#), com 6 a 8 escamas proeminentes mucradas. Cada [escama](#) com 8 a 10 sementes.

## Tipo de Reprodução

[monóica](#)

## Forma de Vida

[árvore](#)

## Início de Floração

fevereiro

## Fim de Floração

março

## Tipo de Fruto

[gálbula](#)

## Consistência do Fruto

seco

## **Maturação do Fruto**

setembro

## **Perenidade**

perenifólia

## **Inflorescência**

cone

(é o nome dado ao estróbilo de algumas Coníferas.)

## **Cor da Flor**

laranja

## **Tipo de Folha**

simples

(Folha em que o limbo constitui uma superfície contínua.)

## **Inserção de Folha**

imbricada

(que, estando muito próximo de outros os cobre parcialmente, como as telhas dum telhado ou as escamas dos peixes, revestindo o seu conjunto uma superfície.)

## **Margem da Folha**

inteira

(com a margem não recortada.)

## **Limbo da Folha**

escamiforme

(em forma de escama, isto é, folhas rudimentares, modificadas, que podem ser carnudas, membranosas, coriáceas ou lenhosas.)

## **Habitat**

Zonas montanhosas do México onde tem larga expansão até 1.800-2.600 m de altitude, em particular nas montanhas do maciço central, onde forma boques puros. Em Portugal é [exótica](#) e muito cultivada, por vezes naturalizada.

## Observações

Esta [espécie](#), denominada vulgarmente por cedro-do-buçaco, na realidade não é um cedro (*Cedrus*), mas sim um cipreste (*Cupressus*). Por outro lado o restritivo específico lusitânica, sugere que a sua origem seria Portugal, mas na realidade é originária da América Central (México, Guatemala e Costa Rica). Tal engano advém do facto do autor desta [espécie](#) (Philip Miller), em 1768, ter feito a sua classificação a partir de exemplares provenientes de Portugal, mais precisamente da Mata do Buçaco. Miller não conhecia o país de origem da [espécie](#) e supôs que teria vindo de Goa, erro que foi repetidamente cometido em diversas publicações anglo-saxónicas desde o século XVIII, de forma que ficou conhecida na língua inglesa por *cedar-of-goat* (Cedro-de-Goa).

Em Portugal, o cedro-do-buçaco encontra condições ecológicas excepcionais, como se poderá comprovar em inúmeros exemplares monumentais em alguns locais do país, destacando-se entre eles os da Mata do Buçaco e do Parque da Pena e Monserrate, entre outros.

## Aplicações

A sua madeira é de boa qualidade, sendo apreciada em marcenaria, para produção de móveis. É pesada, dura, de grão fino, fácil de trabalhar, sendo o alburno de cor branca-amarelada e o cerne castanho avermelhado. É a [espécie](#) de *Cupressus* mais difundida no nosso país, formando sebes em jardins e cortinas de abrigo contra os ventos para defesa de culturas. É igualmente uma [espécie](#) que resiste bem a podas, proporcionando a criação de vários tipos de figuras e desenhos.

**Porte**



**Folha**



**Flor**



**Fruto**



## Tronco

