

# SERRAVES

---

*Acer campestre* L.

## 6 Exemplos no Parque



### **Família**

Sapindaceae

## Nome Comum

bordo, ácer, ácer-campestre, bordo-comum

## Origem

Europa (Dinamarca, Polónia e Bielorrússia), sudoeste da Ásia (Turquia ao Cáucaso) e norte de África (montanhas do Atlas).

## Tipo de Origem

[alóctone](#)

## Autor

L.

## Descrição

O ácer-campestre é uma [árvore](#) caducifólia que pode chegar aos 20 m de altura. As folhas são opostas, longamente pecioladas, algo coriáceas e de cor mais pálida na [página](#) inferior; quando novas possuem muitos [pelos](#), medem geralmente de 3 a 8 cm, cordiformes na base e palmadas, com 5 lobos profundos e obtusos, os exteriores são, por vezes, muito reduzidos, podendo mesmo não existir. As flores estão dispostas em inflorescências pendentes, [corimbosas](#); verdes, com [cálice](#) e [corola](#) bem desenvolvidos. São quase [sempre](#) unissexuais, mas também podem ser poligâmicas. O fruto ([sâmara](#)) é provido de 2 asas membranosas, que se estreitam um pouco na base e acabam por se afastar, formando um ângulo próximo de 180°.

## Tipo de Reprodução

[monóica](#)

## Forma de Vida

[árvore](#)

## Início de Floração

abril

## Fim de Floração

maio

## Tipo de Fruto

[sâmara](#)

## Consistência do Fruto

seco

## **Maturação do Fruto**

setembro

## **Perenidade**

caducifolia

## **Inflorescência**

corimbo

(inflorescência tipo cacho, na qual as flores, devido ao desigual comprimento dos eixos (os inferiores muito mais longos), se situam mais ou menos ao mesmo nível. O corimbo também pode ser simples ou composto.)

## **Cor da Flor**

verde

## **Tipo de Folha**

simples

(Folha em que o limbo constitui uma superfície contínua.)

## **Inserção de Folha**

oposta

(quando existem duas folhas em cada nó.)

## **Margem da Folha**

lobada

(dividida em lobos, isto é, partições que alcançam frequentemente o meio do limbo.)

## **Limbo da Folha**

lobado

(que está dividido em lobos, isto é, partições que não alcançam o meio do limbo.)

## **Habitat**

Isolados nas orlas dos bosques ou formando pequenos bosquetes em zonas de carvalhais, castinçais, sobre solos frescos, sem preferência edáfica.

## **Observações**

Cultiva-se frequentemente como [árvore](#) de sombra e também para formar sebes, pois aguenta muito bem as podas. Muito semelhantes à zelha (*Acer monpessulanum*), sendo frequentemente confundido com este, no entanto as folhas da zelha são mais ásperas e mais pequenas, só com 3 lóbulos de tamanho semelhante, ovados e inteiros e asas do fruto em ângulo [agudo](#) ou paralelo.

## Aplicações

A madeira desta [espécie](#) é dura, compacta e amarelada, muito apreciada em carpintaria para móveis. Outrora as suas folhas e brotos, eram utilizados como alimento para o gado.

## Porte



**Folha**





**Flor**



**Fruto**





## Tronco

